



nutritionDay
WORLDWIDE

Onkologie-Nationalbericht

Mai, 2016

nutritionDay November 2015 in AUSTRIA

Liebe/r Teilnehmer/in,

herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am nutritionDay worldwide im November 2015 sowie für Ihre Bemühungen. Wir senden Ihnen Ihren Onkologie-Nationalbericht mit folgendem Stichprobenumfang:

Anzahl der Stationen am nutritionDay: 141
Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebogen 1_Onko: 68
Anzahl der Patienten am nutritionDay: 2665
Anzahl der Krebs-Patienten am nutritionDay: 382 <i>(bezieht sich auf Blatt 2 „betroffene Organsysteme“)</i>
Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebogen 2_Onko: 387
Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebogen 3_Onko: 371

Referenzwerte des Onkologie Kurzberichts basieren auf Daten onkologischer Patienten von nutritionDay 2015 aller Fachrichtungen.

Der Onkologie-Bericht enthält die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Krebspatienten sowie ernährungsrelevante Organisationsstrukturen und -Prozesse der Stationen in Ihrem Land im Überblick. Ergebnisse im Detail zu Ihrer Teilnahme finden Sie in Ihrem regulären Nationalbericht.

Der nächste nutritionDay wird am 10. November 2016 stattfinden. Abermals würden wir Ihre Teilnahme sehr zu schätzen wissen. Weitere Informationen werden wir Ihnen gerne so bald wie möglich zur Verfügung stellen!

Mit besten Grüßen vom nutritionDay-Team!

Prof. Dr. Michael Hiesmayr

Sigrid Kosak, MA

Stationsresultate ("Bogen 1"):	IHRE RESULTATE	REFERENZWERTE
Anzahl der Stationen mit Krebspatienten	68	275
Vorhandensein eines elektronischen Dokumentationssystems	62 Stat. (91%) JA	262 Stat. (95%) JA
Ernährungstherapie ist Teil der Behandlung von Krebspatienten	65 Stat. (96%) JA	245 Stat. (89%) JA
Ernährungstherapie wird eingesetzt...		
Routinemäßig	29 (42.6%)	171 (62.2%)
Wenn der Patient fragt	39 (57.4%)	87 (31.6%)
Bei Gewichtsverlust > 10%	39 (57.4%)	100 (36.4%)
In Palliativpflege	39 (57.4%)	79 (28.7%)
Anderes	19 (27.9%)	30 (10.9%)
Keine Angabe	1 (1.47%)	23 (8.36%)
Ernährungstherapie wird nicht eingesetzt, weil...		
Mangel an Evidenz	2 (2.94%)	6 (2.18%)
Mangelndes Wissen auf diesem Gebiet	-	11 (4.00%)
Keine Vergütung	-	8 (2.91%)
Es ernährt den Tumor	-	-
Anderes	5 (7.35%)	16 (5.82%)
Einsatz von Methoden der Ernährungstherapie bei Krebspatienten		
Verpflegung entsprechend Ernährungsplan	55 (80.9%)	195 (70.9%)
Kalkulation des Energiebedarfs	46 (67.6%)	164 (59.6%)
Monitoring und Ergänzung der Nahrungsaufnahme durch künstliche Ernährung	63 (92.6%)	242 (88.0%)
Keine	-	-
Anderes	11 (16.2%)	26 (9.45%)
Keine Angabe	2 (2.94%)	6 (2.18%)
Methoden der Ernährungstherapie werden nicht eingesetzt, wegen...		
Mangel an Evidenz	1 (1.47%)	2 (0.73%)
Mangelnder Erfahrung auf diesem Gebiet	-	5 (1.82%)
Keiner Vergütung	-	6 (2.18%)
Mangel an Diätologen	-	8 (2.91%)
Mangel an anderen Experten	-	1 (0.36%)
Anderes	3 (4.41%)	7 (2.55%)
Keine Angabe	-	-
Parameter Erhebung bei Krebspatienten: Häufigkeit der Erhebung und verwendete Methoden:		
Körperzusammensetzung		
Gewicht		
Regelmäßig	37 (54.4%)	170 (61.8%)
Bei jeder Chemotherapie	15 (22.1%)	46 (16.7%)
Bei Bedarf	14 (20.6%)	52 (18.9%)

Nie	1 (1.47%)	1 (0.36%)
Unbekannt	-	1 (0.36%)
Keine Angabe	1 (1.47%)	5 (1.82%)
Anthropometrie (Körperumfang)		
Regelmäßig	2 (2.94%)	25 (9.09%)
Bei jeder Chemotherapie	3 (4.41%)	9 (3.27%)
Bei Bedarf	19 (27.9%)	89 (32.4%)
Nie	36 (52.9%)	122 (44.4%)
Unbekannt	3 (4.41%)	8 (2.91%)
Keine Angabe	5 (7.35%)	22 (8.00%)
BIA		
Regelmäßig	3 (4.41%)	3 (1.09%)
Bei jeder Chemotherapie	-	-
Bei Bedarf	10 (14.7%)	68 (24.7%)
Nie	40 (58.8%)	162 (58.9%)
Unbekannt	7 (10.3%)	18 (6.55%)
Keine Angabe	8 (11.8%)	24 (8.73%)
CT SCAN		
Regelmäßig	8 (11.8%)	10 (3.64%)
Bei jeder Chemotherapie	-	-
Bei Bedarf	14 (20.6%)	84 (30.5%)
Nie	33 (48.5%)	139 (50.5%)
Unbekannt	4 (5.88%)	14 (5.09%)
Keine Angabe	9 (13.2%)	28 (10.2%)
DEXA		
Regelmäßig	2 (2.94%)	3 (1.09%)
Bei jeder Chemotherapie	1 (1.47%)	2 (0.73%)
Bei Bedarf	17 (25.0%)	60 (21.8%)
Nie	31 (45.6%)	159 (57.8%)
Unbekannt	8 (11.8%)	20 (7.27%)
Keine Angabe	9 (13.2%)	31 (11.3%)
Andere Methoden (Körperzusammensetzung)		
Regelmäßig	2 (2.94%)	6 (2.18%)
Bei jeder Chemotherapie	-	-
Bei Bedarf	-	24 (8.73%)
Nie	22 (32.4%)	85 (30.9%)
Unbekannt	9 (13.2%)	34 (12.4%)
Keine Angabe	35 (51.5%)	126 (45.8%)
Körperfunktion:		
Handgrip (Handkraft)		
Regelmäßig	2 (2.94%)	15 (5.45%)
Bei jeder Chemotherapie	1 (1.47%)	1 (0.36%)
Bei Bedarf	11 (16.2%)	62 (22.5%)
Nie	46 (67.6%)	167 (60.7%)
Unbekannt	2 (2.94%)	8 (2.91%)
Keine Angabe	6 (8.82%)	22 (8.00%)
6-Minuten Gehstest		
Regelmäßig	1 (1.47%)	4 (1.45%)

Bei jeder Chemotherapie	1 (1.47%)	2 (0.73%)
Bei Bedarf	7 (10.3%)	53 (19.3%)
Nie	51 (75.0%)	182 (66.2%)
Unbekannt	1 (1.47%)	7 (2.55%)
Keine Angabe	7 (10.3%)	27 (9.82%)
Andere Methoden (Körperfunktion)		
Regelmäßig	-	2 (0.73%)
Bei jeder Chemotherapie	1 (1.47%)	1 (0.36%)
Bei Bedarf	2 (2.94%)	28 (10.2%)
Nie	30 (44.1%)	109 (39.6%)
Unbekannt	9 (13.2%)	32 (11.6%)
Keine Angabe	26 (38.2%)	103 (37.5%)
Energiebedarf, berechnet		
Regelmäßig	8 (11.8%)	71 (25.8%)
Bei jeder Chemotherapie	2 (2.94%)	4 (1.45%)
Bei Bedarf	31 (45.6%)	113 (41.1%)
Nie	14 (20.6%)	29 (10.5%)
Unbekannt	-	5 (1.82%)
Keine Angabe	13 (19.1%)	53 (19.3%)
Nahrungsaufnahme:		
Jede Mahlzeit		
Regelmäßig	7 (10.3%)	66 (24.0%)
Bei jeder Chemotherapie	2 (2.94%)	2 (0.73%)
Bei Bedarf	31 (45.6%)	117 (42.5%)
Nie	16 (23.5%)	40 (14.5%)
Unbekannt	2 (2.94%)	8 (2.91%)
Keine Angabe	10 (14.7%)	42 (15.3%)
1 Mahlzeit pro Tag		
Regelmäßig	2 (2.94%)	20 (7.27%)
Bei jeder Chemotherapie	-	1 (0.36%)
Bei Bedarf	16 (23.5%)	66 (24.0%)
Nie	22 (32.4%)	65 (23.6%)
Unbekannt	3 (4.41%)	18 (6.55%)
Keine Angabe	25 (36.8%)	105 (38.2%)
2 Mahlzeiten pro Tag		
Regelmäßig	3 (4.41%)	17 (6.18%)
Bei jeder Chemotherapie	1 (1.47%)	2 (0.73%)
Bei Bedarf	14 (20.6%)	66 (24.0%)
Nie	23 (33.8%)	69 (25.1%)
Unbekannt	3 (4.41%)	18 (6.55%)
Keine Angabe	24 (35.3%)	103 (37.5%)
24h recall		
Regelmäßig	3 (4.41%)	48 (17.5%)
Bei jeder Chemotherapie	1 (1.47%)	2 (0.73%)
Bei Bedarf	23 (33.8%)	85 (30.9%)
Nie	23 (33.8%)	50 (18.2%)
Unbekannt	3 (4.41%)	14 (5.09%)
Keine Angabe	15 (22.1%)	76 (27.6%)

Andere Methoden (Nahrungsaufnahme)

Regelmäßig	4 (5.88%)	12 (4.36%)
Bei jeder Chemotherapie	-	1 (0.36%)
Bei Bedarf	4 (5.88%)	36 (13.1%)
Nie	21 (30.9%)	58 (21.1%)
Unbekannt	10 (14.7%)	26 (9.45%)
Keine Angabe	29 (42.6%)	142 (51.6%)

Fragebogen wurde ausgefüllt von

Diätassistent	15 (22.1%)	100 (36.4%)
Pflegekraft	36 (52.9%)	105 (38.2%)
Arzt	13 (19.1%)	43 (15.6%)
Ernährungswissenschaftler	-	19 (6.91%)
Anderes	2 (2.94%)	4 (1.45%)
Keine Angabe	2 (2.94%)	4 (1.45%)

Patientenresultate ("Bogen 2"):	IHRE RESULTATE	REFERENZWERTE
Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebogen	387	2607
2_Onko:		
Demographische Daten		
Alter (Jahre)	68 [21-105]	65 [3-105]
Weibliches Geschlecht	179 (46.3%)	1167 (44.8%)
Gewicht (kg)	74.0 ± 19.5	68.0 ± 17.1
Größe (cm)	170.3 ± 9.6	166.2 ± 10.3
BMI (kg/m ²)	25.4 ± 5.9	24.4 ± 5.2
Ambulant (o) /Stationär (w)		
Ambulant (o)	10 (2.58%)	22 (0.84%)
Stationär (w)	377 (97.4%)	2580 (99.0%)
Keine Angabe	-	5 (0.19%)
Therapieziel		
Kurativ	182 (47.0%)	1402 (53.8%)
Palliativ	177 (45.7%)	1006 (38.6%)
Terminal	12 (3.10%)	113 (4.33%)
Keine Angabe	16 (4.13%)	86 (3.30%)
Aufnahmegrund		
Diagnostik	47 (12.1%)	355 (13.6%)
Therapie	199 (51.4%)	1228 (47.1%)
Operation	61 (15.8%)	423 (16.2%)
Behandlungskomplikationen	18 (4.65%)	365 (14.0%)
Schlechter Gesundheitszustand	78 (20.2%)	418 (16.0%)
Selbstständige Pflege schwierig	10 (2.58%)	38 (1.46%)
Keine Angabe	-	-
Aktuelle Krebsdiagnose		
Brust	18 (4.65%)	180 (6.90%)
Dick- und Mastdarm	61 (15.8%)	427 (16.4%)
Prostata	13 (3.36%)	98 (3.76%)
Lunge	56 (14.5%)	312 (12.0%)
Haut	5 (1.29%)	35 (1.34%)
Blase/Niere	13 (3.36%)	126 (4.83%)
Magen/Speiseröhre	26 (6.72%)	274 (10.5%)
Bauchspeicheldrüse	19 (4.91%)	126 (4.83%)
Lymphom	20 (5.17%)	165 (6.33%)
HNO	34 (8.79%)	171 (6.56%)
Leukämie	44 (11.4%)	163 (6.25%)
Genitaltrakt	13 (3.36%)	121 (4.64%)
Leber	14 (3.62%)	123 (4.72%)
Sarkom	5 (1.29%)	41 (1.57%)
Hirn	11 (2.84%)	54 (2.07%)
Hoden	7 (1.81%)	17 (0.65%)
Anderes	39 (10.1%)	257 (9.86%)
Keine Angabe	15 (3.88%)	108 (4.14%)
Zeit seit Diagnose		
0-2 Monate	90 (23.3%)	777 (29.8%)
3-5 Monate	72 (18.6%)	412 (15.8%)

6-12 Monate	56 (14.5%)	388 (14.9%)
1-2 Jahre	51 (13.2%)	314 (12.0%)
2-4 Jahre	38 (9.82%)	232 (8.90%)
> 4 Jahre	52 (13.4%)	268 (10.3%)
keine Angabe	16 (4.13%)	172 (6.60%)
Krebs-Staging		
0=Carcinoma in situ	17 (4.39%)	90 (3.45%)
I=Lokal	52 (13.4%)	375 (14.4%)
II=Frühes Stadium lokal fortgeschritten	63 (16.3%)	345 (13.2%)
III=Spätes Stadium lokal Fortgeschritten	57 (14.7%)	392 (15.0%)
IV=Metastasierend	147 (38.0%)	955 (36.6%)
Keine Angabe	51 (13.2%)	450 (17.3%)
Zeit seit erstem Therapiebeginn		
Keine Therapie	24 (6.20%)	187 (7.17%)
Staging/Diagnose	45 (11.6%)	200 (7.67%)
0-2 Monate	90 (23.3%)	736 (28.2%)
3-5 Monate	57 (14.7%)	345 (13.2%)
6-12 Monate	50 (12.9%)	338 (13.0%)
1-2 Jahre	41 (10.6%)	232 (8.90%)
2-4 Jahre	30 (7.75%)	176 (6.75%)
> 4 Jahre	45 (11.6%)	250 (9.59%)
Keine Angabe	18 (4.65%)	163 (6.25%)
Therapie Situation		
Diagnose	32 (8.27%)	236 (9.05%)
Chemotherapie 1st line	87 (22.5%)	488 (18.7%)
Chemotherapie > 1st line	74 (19.1%)	367 (14.1%)
Radiotherapie	58 (15.0%)	272 (10.4%)
Target Therapie	12 (3.10%)	84 (3.22%)
Hormontherapie	5 (1.29%)	26 (1.00%)
Palliativ	63 (16.3%)	359 (13.8%)
Operation	46 (11.9%)	504 (19.3%)
Krebsbezogene Komplikationen	32 (8.27%)	266 (10.2%)
Therapiebezogene Komplikationen	18 (4.65%)	127 (4.87%)
Keine Angabe	19 (4.91%)	153 (5.87%)
Infektionen		
Keine	276 (71.3%)	1808 (69.4%)
Lokal	51 (13.2%)	381 (14.6%)
Generell	37 (9.56%)	179 (6.87%)
Keine Angabe	23 (5.94%)	239 (9.17%)
Ernährungstherapie		
Keine spezielle Diät	206 (53.2%)	1080 (41.4%)
Individuell zusammengestellte Diät	85 (22.0%)	572 (21.9%)
Energie-/ Proteinangereicherte ONS	42 (10.9%)	426 (16.3%)
Enterale Ernährung (NGT/PEG)	18 (4.65%)	128 (4.91%)
Parenterale Ernährung	13 (3.36%)	240 (9.21%)
ONS angereichert mit speziellen Nährstoffen	10 (2.58%)	88 (3.38%)
Spezielle Nährstoffe (EPA, verzweigtkettige Aminosäuren, Glutamine, Arginine, Carnitine)	9 (2.33%)	28 (1.07%)
Persönliche Vorlieben	25 (6.46%)	284 (10.9%)
Ernährungsberatung	48 (12.4%)	355 (13.6%)

Anderes	29 (7.49%)	202 (7.75%)
Keine Angabe	-	-

Patientenresultate ("Bogen 3"):	IHRE RESULTATE	REFERENZWERTE
Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebogen 3_Onko	371	2474
Standardgewicht vor der Krebserkrankung	78 [45-199]	73 [30-199]
Derzeitiges Gewicht	72 [37-200]	67 [10-200]
Gewichtveränderung war		
Gewollt	20 (5.17%)	64 (2.45%)
Ungewollt	223 (57.6%)	1489 (57.1%)
Gewicht ist gleichgeblieben	46 (11.9%)	318 (12.2%)
Keine Angabe	18 (4.65%)	111 (4.26%)
In der letzten Woche		
Patienten, die Schmerzen hatten:		
Überhaupt nicht	108 (27.9%)	709 (27.2%)
Wenig	59 (15.2%)	596 (22.9%)
Mäßig	72 (18.6%)	419 (16.1%)
Sehr	75 (19.4%)	332 (12.7%)
Keine Angabe	66 (17.1%)	530 (20.3%)
Patienten, die sich ausruhen mussten:		
Überhaupt nicht	38 (9.82%)	391 (15.0%)
Wenig	49 (12.7%)	592 (22.7%)
Mäßig	97 (25.1%)	575 (22.1%)
Sehr	128 (33.1%)	488 (18.7%)
Keine Angabe	69 (17.8%)	540 (20.7%)
Patienten, die sich schwach fühlten:		
Überhaupt nicht	43 (11.1%)	420 (16.1%)
Wenig	51 (13.2%)	583 (22.4%)
Mäßig	95 (24.5%)	535 (20.5%)
Sehr	123 (31.8%)	499 (19.1%)
Keine Angabe	68 (17.6%)	544 (20.9%)
Patienten, die sich niedergeschlagen fühlten:		
Überhaupt nicht	86 (22.2%)	775 (29.7%)
Wenig	46 (11.9%)	601 (23.1%)
Mäßig	82 (21.2%)	356 (13.7%)
Sehr	99 (25.6%)	298 (11.4%)
Keine Angabe	66 (17.1%)	546 (20.9%)
Patienten, die müde waren:		
Überhaupt nicht	41 (10.6%)	445 (17.1%)
Wenig	58 (15.0%)	611 (23.4%)
Mäßig	84 (21.7%)	534 (20.5%)
Sehr	131 (33.9%)	449 (17.2%)
Keine Angabe	67 (17.3%)	539 (20.7%)
Patienten, die sich durch Schmerzen in ihrem alltäglichem Leben beeinträchtigt fühlten:		
Überhaupt nicht	116 (30.0%)	766 (29.4%)
Wenig	47 (12.1%)	458 (17.6%)

Mäßig	49 (12.7%)	366 (14.0%)
Sehr	92 (23.8%)	398 (15.3%)
Keine Angabe	69 (17.8%)	582 (22.3%)
Patienten mit Appetitmangel:		
Überhaupt nicht	111 (28.7%)	779 (29.9%)
Wenig	47 (12.1%)	485 (18.6%)
Mäßig	51 (13.2%)	378 (14.5%)
Sehr	101 (26.1%)	391 (15.0%)
Keine Angabe	68 (17.6%)	548 (21.0%)
Momentan		
Patienten mit Schmerzen:		
Überhaupt nicht	147 (38.0%)	901 (34.6%)
Wenig	75 (19.4%)	676 (25.9%)
Mäßig	64 (16.5%)	327 (12.5%)
Sehr	28 (7.24%)	152 (5.83%)
Keine Angabe	68 (17.6%)	533 (20.4%)
Patienten, die sich ausruhen müssen:		
Überhaupt nicht	51 (13.2%)	438 (16.8%)
Wenig	63 (16.3%)	705 (27.0%)
Mäßig	103 (26.6%)	555 (21.3%)
Sehr	95 (24.5%)	347 (13.3%)
Keine Angabe	70 (18.1%)	538 (20.6%)
Patienten, die sich schwach fühlen:		
Überhaupt nicht	64 (16.5%)	503 (19.3%)
Wenig	54 (14.0%)	647 (24.8%)
Mäßig	103 (26.6%)	538 (20.6%)
Sehr	91 (23.5%)	352 (13.5%)
Keine Angabe	67 (17.3%)	541 (20.8%)
Patienten, die sich niedergeschlagen fühlen:		
Überhaupt nicht	108 (27.9%)	915 (35.1%)
Wenig	50 (12.9%)	559 (21.4%)
Mäßig	75 (19.4%)	332 (12.7%)
Sehr	77 (19.9%)	225 (8.63%)
Keine Angabe	71 (18.3%)	549 (21.1%)
Patienten, die müde sind:		
Überhaupt nicht	62 (16.0%)	537 (20.6%)
Wenig	62 (16.0%)	669 (25.7%)
Mäßig	90 (23.3%)	500 (19.2%)
Sehr	96 (24.8%)	326 (12.5%)
Keine Angabe	70 (18.1%)	549 (21.1%)
Patienten, die sich in ihrem alltäglichen Leben durch Schmerzen beeinträchtigt fühlen:		
Überhaupt nicht	129 (33.3%)	881 (33.8%)
Wenig	54 (14.0%)	483 (18.5%)
Mäßig	50 (12.9%)	346 (13.3%)
Sehr	68 (17.6%)	301 (11.5%)
Keine Angabe	74 (19.1%)	563 (21.6%)

Patienten mit Appetitmangel:		
Überhaupt nicht	133 (34.4%)	882 (33.8%)
Wenig	35 (9.04%)	503 (19.3%)
Mäßig	57 (14.7%)	341 (13.1%)
Sehr	83 (21.4%)	309 (11.9%)
Keine Angabe	68 (17.6%)	547 (21.0%)
Gründe für Änderung Nahrungsaufnahme/Appetit		
Übelkeit/Erbrechen	44 (11.4%)	396 (15.2%)
Entzündung im Mund	21 (5.43%)	111 (4.26%)
Schmerzen	31 (8.01%)	288 (11.0%)
Verstopfung	24 (6.20%)	167 (6.41%)
Durchfall	21 (5.43%)	107 (4.10%)
Geschmacks-/Geruchsveränderungen	56 (14.5%)	318 (12.2%)
Vorzeitige Sättigung/Appetitsverlust	92 (23.8%)	520 (19.9%)
Anderes	60 (15.5%)	340 (13.0%)
Keine Angabe	11 (2.84%)	86 (3.30%)
Maximal durchführbare Aktivitäten		
Sportliche Aktivitäten	19 (4.91%)	56 (2.15%)
Ohne körperliche Einschränkungen aktiv	57 (14.7%)	316 (12.1%)
Leichte Tätigkeiten	103 (26.6%)	501 (19.2%)
Selbstständiges Waschen und Ankleiden möglich	69 (17.8%)	497 (19.1%)
Brauche Hilfe beim Waschen und Ankleiden	40 (10.3%)	361 (13.8%)
Ganztags ruhebedürftig	26 (6.72%)	312 (12.0%)
Keine Angabe	71 (18.3%)	550 (21.1%)
Patient nimmt zusätzlich zu vom Arzt verschriebenen Medikamenten:		
Nichts	180 (46.5%)	1426 (54.7%)
Gewürz- und Kräutertee	47 (12.1%)	198 (7.59%)
Nahrungsergänzungsmittel	41 (10.6%)	199 (7.63%)
Vitamine	19 (4.91%)	80 (3.07%)
Anderer Medikamente	17 (4.39%)	85 (3.26%)
Anderes	21 (5.43%)	112 (4.30%)
Keine Angabe	85 (22.0%)	612 (23.5%)
Aktivitäten, die der Patient durchführt		
Nichts	202 (52.2%)	1475 (56.6%)
Psychotherapie	29 (7.49%)	70 (2.69%)
Yoga	4 (1.03%)	24 (0.92%)
Meditation	13 (3.36%)	82 (3.15%)
progressive Muskelentspannung	11 (2.84%)	49 (1.88%)
Qigong	2 (0.52%)	3 (0.12%)
Anderes	48 (12.4%)	225 (8.63%)
Keine Angabe	89 (23.0%)	713 (27.3%)
Patienten mit Schwierigkeiten die Behandlungsvorgaben einzuhalten	35 (9.04%)	545 (20.9%)
Patienten, die Hilfe beim Ausfüllen erhalten haben	160 (41.3%)	1332 (51.1%)
Patienten, die denken, dass eine Ernährungstherapie Ihnen bei Ihrer Erkrankung helfen würde	111 (28.7%)	1364 (52.3%)